

⚠️ 丙烯酰胺基準水平    ⬆️ 超出基準水平    📶 接近基準水平樣本

1. 薯片  
Potato Crisps

⚠️ 750微克/公斤  
⬆️ 8款樣本 (7.7%)  
📶 14款樣本 (13.5%)  
平均值: 457微克/公斤



104樣本

2. 蔬菜脆片  
Vegetable Crisps

⚠️ -  
⬆️ -  
📶 -  
平均值: 1,121微克/公斤



27樣本

3. 薯條  
French Fries

⚠️ 500微克/公斤  
⬆️ 2款樣本 (3.4%)  
📶 7款樣本 (12.1%)  
平均值: 266微克/公斤



58樣本

4. 供幼兒及嬰兒食用的餅乾  
Biscuits for Infants and Young Children

⚠️ 150微克/公斤  
⬆️ 4款樣本 (6.3%)  
📶 8款樣本 (12.7%)  
平均值: 112微克/公斤



63樣本

5a. 一般餅乾及威化餅  
Biscuits and Wafers

⚠️ 350微克/公斤  
⬆️ 14款樣本 (13.1%)  
📶 23款樣本 (21.5%)  
平均值: 220微克/公斤



107樣本

5b. 3歲以下兒童經常食用的餅乾及威化餅  
Biscuits and wafers frequently consumed by children below 3 years old

⚠️ 150微克/公斤  
⬆️ 28款樣本 (63.6%)  
📶 5款樣本 (11.4%)  
平均值: 251微克/公斤



44樣本

6. 克力架餅  
Crackers

⚠️ 400微克/公斤  
⬆️ 沒有樣本  
📶 沒有樣本  
平均值: 136微克/公斤



22樣本

7. 薑餅  
Ginger Bread

⚠️ 800微克/公斤  
⬆️ 沒有樣本  
📶 沒有樣本  
平均值: 126微克/公斤



2樣本

8. 烘麵包  
Toasted Bread

⚠️ 350微克/公斤  
⬆️ 1款樣本 (3.1%)  
📶 1款樣本 (3.1%)  
平均值: 101微克/公斤



32樣本

9. 嬰兒食品  
Baby Foods

⚠️ 40微克/公斤  
⬆️ 3款樣本 (13%)  
📶 沒有樣本  
平均值: 18微克/公斤



23樣本

10. 穀類早餐 (包括粟米、燕麥、斯佩耳特小麥、大麥和小米製成品)  
Breakfast Cereals (including maize, oat, spelt, barley and rice-based products)

⚠️ 150微克/公斤  
⬆️ 沒有樣本  
📶 2款樣本 (9.1%)  
平均值: 59微克/公斤



22樣本

11. 穀類早餐 (包括麩皮產品和全麥穀物、膨化穀物、小麥和黑麥製成品)  
Breakfast Cereals (including bran products and whole grain cereals, gun puffed grain, wheat and rye-based products)

⚠️ 300微克/公斤  
⬆️ 1款樣本 (3.1%)  
📶 4款樣本 (12.5%)  
平均值: 107微克/公斤



32樣本

12. 即溶咖啡  
Instant Coffee

⚠️ 850微克/公斤  
⬆️ 沒有樣本  
📶 4款樣本 (66.7%)  
平均值: 730微克/公斤



6樣本

13. 烘焙咖啡粉  
Ground Coffee Roasted

⚠️ 400微克/公斤  
⬆️ 沒有樣本  
📶 2款樣本 (9.5%)  
平均值: 264微克/公斤



21樣本

14. 咖啡替代品(菊苣或其混合物)  
Chicory (or mixed products)

⚠️ 4,000或以下微克/公斤  
⬆️ 沒有樣本  
📶 2款樣本 (15.4%)  
平均值: -



13樣本

註 參考歐盟法規2017/2158「減少食物中丙烯酰胺含量的緩解措施和基準水平」。該法規沒有為蔬菜脆片設定基準水平。5b是5a樣本內其中44款ICRT認為屬於兒童經常食用的，或包裝印有吸引兒童的卡通、圖畫或圖片的，由於這些餅乾有機會被小於3歲的幼兒食用，因此ICRT也

將這些樣本的測試結果與供幼兒及嬰兒食用的餅乾的基準水平（即每公斤150微克）比較。咖啡替代品的基準水平要視乎其穀物和菊苣在製成品中混合的比例。ICRT並未有為這類別的樣本計算丙烯酰胺含量平均值。